



SPWSZ
w Szczecinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
71-455 SZCZECIN, UL. ARKOŃSKA 4

ZALECENIA DLA PACJENTA
PO ZABIEGU USUNIĘCIA TORBIELI SZCZĘKI, PO ZABIEGU USUNIĘCIA TORBIELI
ŻUCHWY

Podczas pielęgnacji rany w domu należy bezwzględnie przestrzegać zasad aseptyki. Takie postępowanie gwarantuje prawidłowy przebieg procesu gojenia się rany.

POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU :

- Oszczędny tryb życia przez okres 2 tygodni;
- Dieta miękka przez okres 2 tygodni;
- Unikanie zwiększania ciśnienia w zatokach żuchwy przez okres 6 tygodni;
- Stosowanie zleconych kropli do nosa przez okres 2 tygodni;
- Płukanie jamy ustnej preparatem typu Corsodyl / Eludril przez okres 2 tygodni;
- Kontrola w Poradni, celem oceny stanu miejscowego i usunięcia szwów 14 dni po zabiegu.

Opracowanie z dn. 14.04.2023

Anna Skibicka

Specjalista pielęgniarzka/Pielęgniarz